Czerwce ozdobnych drzew liściastych

Misecznik dębowy należy do rodziny misecznikowatych, zasiedla wiele gatunków drzew i krzewów, głównie dęby. Larwy i samice żerują na cienkich pędach, które nawet mogą zamierać. Wydzielają przy tym spadź, na której osadzają się grzyby sadzakowe. Ciało samic pokryte jest kasztanowobrązową lub czerwonobrązową tarczką, długości 6 mm, szerokości 4 mm. Młode samice w przedniej części tarczki mają 3 poprzeczne paski, w tylnej zaś czerwoną kropkę i 5 przerywanych pasków. Larwy drugiego stadium, długości 0,6-1 mm są owalne, szarobrązowe lub jasnobrązowe z ciemnymi kropkami w części przedniej. Larwy II stadium zimują na korze pędów. Samice od końca maja do końca czerwca składają jaja, każda po 700 sztuk. Po ok. 40 dniach wylęgają się larwy, które wędrują na dolną stronę liści i tam żerują do połowy września osiągając II stadium. Od połowy października przechodzą na pędy, gdzie zimują.

Szczelinczyk jesionowy jest czerwcem z rodziny szczelinczykowatych, występującym w szkółkach na jesionie wyniosłym. Samice i larwy żerują w licznych koloniach w szczelinach kory pni i konarów, wysysając soki. Rośliny słabiej rosną, a nawet zasychają. Owalne samice długości 0,75 mm są pomarańczowoczerwone i pokryte kremowym woreczkiem jajowym długości 1 mm, powstałym ze sklejonych nitek woskowych. Larwy I stadium są czerwone. Samce zaś pomarańczowe, pomarańczowożółte z czarnymi oczami. Larwy II stadium zimują w szczelinach kory. Od połowy czerwca samice składają po ok. 90 jaj do woreczka jajowego. W lipcu wylęgają się larwy, które przechodzą na liście i tam żerują do jesieni. Z chwilą, gdy liście zaczynają opadać larwy II stadium osiadają w szczelinach kory.

Łysik wiązowiec należy do rodziny pilśniowatych, występuje na wiązach w parkach i ogrodach miejskich. Larwy i samice żerują licznie na pniach i gałęziach, które wówczas są mocno osłabione. Ciało samic, długości 2,5-3 mm jest owalne, lekko wypukłe, ciemnobrązowe, okryte od dołu i po bokach białoszarym woreczkiem jajowym długości 3,5 mm. Larwy II stadium zimują szczelinach kory. Wiosną żerują na liściach i młodych pędach. Od czerwca samice składają po 120-420 jaj do woreczka jajowego. Od końca lipca wylęgnięte larwy wędrują na dolną stronę liści i tam żerują do jesieni. Przed opadnięciem liści przechodzą na gałęzie, gdzie zimują.

Ewa Żak

Źródło:
K. Wiech „Szkodniki drzew owocowych”
B. Łabanowska, D. Gajek „Szkodniki krzewów owocowych”
G. Łabanowski, G. Soika „Szkodniki drzew liściastych”