
Dokarmianie drzew owocowych po zbiorach

Dokarmianie drzew owocowych jest szczególnie ważne po roku obfitego urodzaju, gdyż wspomaga tworzenie się pąków kwiatowych na rok następny. Zaleca się zastosowanie dolistnego dokarmiania drzew ziarnkowych, jak i pestkowych azotem, borem i cynkiem.

Azot stosowany jest w postaci mocznika. Jabłonie zaleca się nawozić dolistnie 3-krotnie. Pierwszy zabieg dolistnego odżywiania najlepiej wykonać tydzień po zbiorach owoców. Dwa kolejne zabiegi wykonać należy w odstępach co 7-10 dni, stosując kolejno 2-4 i 8 kg mocznika, po 1 kg Boraksu oraz 0,5 kg cynku na 1 ha. Dla jabłoni w pełni owocowania, gdy opadnie już ok. 50% liści zaleca się jednorazowe stosowanie 5-procentowego roztworu mocznika. Mocznik zastosowany w takim stężeniu działa również dezynfekcyjnie – niszczy zarodniki parcha jabłoni.

Dolistne nawożenie czereśni i wiśni zaleca się wykonywać po zbiorach owoców od 3 do 5 razy w odstępach co 7-10 dni stosując na 1 ha sadu 5-10 kg mocznika, 2-4 kg magnezu, 0,5-1 kg boru, 0,3-0,8 kg cynku i 0,5 kg manganu.

Do dolistnego nawożenia drzew zarówno ziarnkowych, jak i pestkowych, można używać (zamiast mocznika) organicznych związków azotu – aminokwasów. Na naszym rynku dostępny jest Aminosol, który zaleca się stosować w dawce 2-3 l/ha 2-krotnie. Pierwszy zabieg należy wykonać po zbiorach, a drugi po upływie 7-10 dni. Specyficzny zapach Aminosolu odstrasza dzikie zwierzęta.

Ewa Grzesik