


Aktualne zalecenia w uprawie i ochronie sadów

Aktualne zalecenia w uprawie i ochronie sadów

2021-05-26



25 maja w laboratorium ŚODR O. Sandomierz „Centrum Ogrodnicze” po raz kolejny wykonaliśmy analizę dojrzałości otoczni grzybni oraz zdolności do infekcji zarodników workowych. Z naszej analizy wynika, że zdolność do wysiewu i infekcji zarodników workowych wynosi około 15-18%. W porównaniu do poprzedniej analizy stanowi to podobne zagrożenie ze strony parcha jabłoni.

W sadach jabłoniowych jest okres końca kwitnienia lub opadania płatków kwiatowych. Zalecamy wykonanie zabiegów środkami powierzchniowymi, stosując preparaty oparte na kaptanie (np. Kaptan 80WG, Merpan 80WDG, Malvin 80WDG, Scab 80WG), ditianon (np. Delan 700WG, Metised 700WG, Caldera 700WG). Mamy duży przyrost masy liściowej w sadach, więc możemy preparaty powierzchniowe połączyć z preparatami układowymi, np. triazole (Cros 250EC, Difo 250EC, Score 250EC), Embrelia 140SC, Serdalis. Nadal mamy dużą presję wysiewów oraz infekcji ze strony mączniaka jabłoni. Zalecamy wykonanie zabiegu z wykorzystaniem preparatów zawierających fenyloacetamidy (np. Kendo 50EW, Cindo 50EW, Mercedes 50EW), siarkę (Siarkol 80WG, Siarkol Extra 80WP), strobilurynę (Zato 50WG, Tercel 16WG, Discus 500WG). Prowadzimy lustrację sadów pod względem zarazy ogniowej, która przy ostatnich zmiennych warunkach mogła infekować

kwiaty. Pod względem szkodników prowadzimy intensywną i dokładną lustrację sadów. Mszyca nie jest jeszcze tak bardzo widoczna, ale pierwsze kolonie w sadach można znaleźć. Przy owocówce zaczęły się pierwsze obloty motyli. Do walki ze szkodnikami możemy użyć preparatów z grup takich jak: neonikotynoidowe (Mospilan 20SP), pyretroidy (Deka 2,5EC, Desha 2,5EC, Delta 50EW) hydroidy (Runner 240SC), kwasy tetronowe (Envidor 240SC), ketoenole (Movento 100SC). Na odmianach, które mają skłonność do ordzawień stosujemy gibereliny. Prowadzimy również dokarmianie dolistne zawiązków wapniem, magnezem, mikroskładnikami.

W sadach gruszkowych kontynuujemy ochronę przeciw rakowi bakteryjnemu drzew owocowych, zarazie ogniowej, gorzkiej zgniliźnie, brunatnej zgniliźnie, parchowi gruszy i mączniakowi przy użyciu standardowych preparatów, zawierających kaptan (Merpan 80WDG, Malvin 80WDG), dodynę (Sillit 65WP, Diana 500SC), triazole (Cros 250EC, Score 250EC), ditianon (Delan 700WG, Caldera 700WG), strobilurynowe (Discus 500WG, Zato 50WG), fenyloacetamidy (Cindo 50EW, Kendo 50EW). Jednocześnie prowadzimy lustrację i ochronę sadów przed szkodnikami, czyli przędziorki, miodówki, mszyce, zwójki, przyszcarki. Do walki ze szkodnikami możemy użyć preparatów z grup takich jak: neonikotynoidowe (Mospilan 20SP, Sekil 20SP, Kobe 20SP), pyretroidy (Deka 2,5EC, Desha 2,5EC, Delta 50EW), ketoenole (Movento 100SC), karboksamidowe (Teppeki 50WG, Afinto Hinode).

W sadach czereśniowych i wiśniowych trwa intensywna ochrona przeciw leukostomozie, rakowi bakteryjnemu drzew owocowych, brunatnej, gorzkiej, i drobnej plamistości drzew pestkowych. Stosujemy środki z grup miedziowych (Miedzian 50WP, Miedzian Extra 350SC), kaptany (Merpan 80WDG, Kapłan 80WG), triazole (Score 250EC, Cros 250EC). Prowadzimy walkę ze szkodnikami (przędziorki, mszyce, zwójki) za pomocą preparatów takich jak Deka 2,5EC, Desha 2,5EC, Movento 100SC, Mospilan 20SP. Niezapominamy o dokarmianiu dolistnym drzew magnezem, wapniem, mikroelementami, ważnymi w okresie wzrostu zawiązków.

W sadach śliwowych prowadzimy ochronę bardzo podobną jak w uprawie wiśni i czereśni. Na choroby takie jak dziurkowatość liści, leukostomoza, mączniak prawdziwy, brunatna zgnilizna drzew pestkowych stosujemy np. Topsin M500SC, Siarkol 80WG, Luna Experience 400SC. Na mszyce, misecznik śliwowy, owocnice stosujemy preparaty takie jak np. Movento 100SC, Mospilan 20SP, Teppeki 50WG.

W celu zastosowania innych preparatów ochrony roślin z podanych grup chemicznych należy zapoznać się z aktualnym programem ochrony roślin lub skontaktować się z naszym doradcą.

Pamiętaj: ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Grzegorz Jurkowski

udostępnij

[Twitter](#) [Facebook](#) [Google+](#)

[do góry](#)