

Aktywność antybiotyczna polskich miodów odmianowych

Aktywność antybiotyczna polskich miodów odmianowych

2020-03-16



Prowadzone są badania na określeniu aktywności antybiotycznej polskich miodów odmianowych oraz miodu manuka. Badaniami, prowadzonymi w latach 1999-2019, objęto 710 próbek miodów odmianowych.

Do próbek zawierających po 1 ml miodu dodawano 0,1 ml standardowego szczepu bakterii *Staphylococcus aureus*. Na podstawie prowadzonych badań określono aktywność antybiotyczną odmian miodów.

Spośród krajowych miodów najwyższą aktywnością antybiotyczną wyróżniały się miody: gryczany, nektarowo-spadziowy, nawłociowy, spadziowy, lipowy i wrzosowy. Nieco niższą aktywność antybiotyczną charakteryzują się miody: rzepakowy, akacjowy i wielokwiatowy. Na tym samym poziomie określono aktywność bakteriobójczą miodu manuka. Spożywanie miodów w okresach przeziębień przyczynia się do podniesienia odporności organizmu. Naturalnym antybiotykiem jest propolis.

Źródło: prof. dr hab. Bogdan Kędzia, mgr Elżbieta Hołderna-Kędzia, „Badania nad aktywnością antybiotyczną polskich miodów odmianowych” -Pasieka 2/2020

udostępni

[Twitter](#) [Facebook](#) [Google+](#)

[do góry](#)